

Principales urgencias estomatológicas, asociadas a dientes retenidos, en pacientes atendidos en el Hospital Mártires de Mayarí

Main Dental Emergencies Associated with Impacted Teeth in Patients Attended at Martires de Mayari Hospital

*Orlando Cobo Vidal*¹, *Yanelis Hernandez Sánchez*², *Miriam Vivar Bauza*³

1. Máster en Atención de Urgencias en Estomatología. Especialista de Primer Grado en Estomatología General Integral. Especialista de Primer Grado en Cirugía Máxilo Facial. Instructor. Hospital Mártires de Mayarí. Holguín. Cuba.
2. Máster en Atención de Urgencias en Estomatología. Instructora. Clínica Estomatológica Manuel Angulo Ferrán. Holguín. Cuba.
3. Especialista de Primer Grado en Cirugía Máxilo Facial. Instructora. Hospital Vladimir Ilich Lenin. Holguín. Cuba.

RESUMEN

Introducción: los dientes retenidos son una afección muy común en la generación actual. El 17% de la población joven presenta uno o más dientes retenidos, esta incidencia es más frecuente en el tercer molar inferior.

Objetivo: caracterizar las urgencias más frecuentes asociadas a dientes retenidos que se presentan en el Servicio de Cirugía Máxilo Facial del Hospital Mártires de Mayarí.

Métodos: el examen clínico y radiográfico fueron utilizados para realizar el estudio descriptivo y transversal en una muestra de 186 pacientes que fueron a consulta en el período comprendido de febrero de 2010-2011.

Resultados: el sexo femenino predominó con 112 casos, que representaron el 60,2% y el grupo de 18 a 24 años de edad, fue el más afectado con el 48,3%. Las urgencias más frecuentes asociadas a las retenciones dentarias fueron las infecciosas con 116 casos para el 62,3%, dentro de ellas, la pericoronitis predominó en 72 pacientes (38,7%), le continuaron las urgencias nerviosas con 63 casos para el 33,8%, seguido de

las urgencias mecánicas que se presentaron en 23 pacientes, para el 10,7%, en la investigación se produjeron, además, otras urgencias.

Conclusiones: el sexo femenino fue el más afectado, la infección más asociada fue la pericoronitis y se aplicó con más frecuencia la terapia medicamentosa.

Palabras clave: urgencias estomatológicas, dientes retenidos, adultos.

ABSTRACT

Introduction: impacted teeth are a common condition in the present generation. 17% of young people have one or more impacted teeth, this incidence is more common in the lower third molar.

Objective: to characterize the most common emergencies associated with impacted teeth that are presented in the Maxillofacial Surgery Service of Martires de Mayarí Hospital.

Methods: the clinical and radiographic examinations were used to carry out a descriptive study in a sample of 186 patients seen in consultation in the period from February 2010 to 2011.

Results: female sex predominated with 112 cases, accounting for 60.2% and the group of 18 to 24 years old was the most affected with 48.3%. The most common emergencies associated with dental deductions were infectious with 116 cases for 62.3%, within them, the pericoronitis predominated in 72 patients (38.7%), nerve emergencies with 63 cases for 33, 8%, followed by mechanical emergencies that occurred in 23 patients, 10.7%, other emergencies were also seen during the research period.

Conclusions: females were the most affected, pericoronitis was the most associated infection and drug therapy was more frequently applied.

Keywords: dentistry urgencies, impacted teeth, adults.

Dr. Orlando Cobo Vidal. Máster en Atención de Urgencias en Estomatología. Especialista de Primer Grado en Estomatología General Integral. Especialista de Primer Grado en Cirugía Máxilo Facial. Instructor. Hospital Mártires de Mayarí. Holguín. Cuba.

Correo electrónico: cobo@mayari.hlg.sld.cu