

Resumen

Policlínica Tamara Bunke. Báguanos. Holguín

Aspectos oclusales y psicológicos en pacientes bruxópatas

Occlusion and Psychological Factors in Bruxism Patients

*Irina Rodríguez Sarmiento*¹, *Mildred Gutiérrez Segura*², *Bárbara Pellitero Reyes*³, *Miguel Orlando Ochoa Rodríguez*⁴

1. Especialista de Primer Grado en Prótesis Estomatológica. Policlínica Tamara Bunke. Báguanos. Holguín
2. Especialista de Segundo Grado en Prótesis Estomatológica. Asistente. Clínica Estomatológica Universitaria Artemio Mastrapa Rodríguez. Holguín
3. Especialista de Segundo Grado en Prótesis Estomatológica. Asistente. Clínica Estomatológica Universitaria Manuel Angulo Farrán. Holguín
4. Especialista de Segundo Grado en Fisiología Normal y Patológica. Profesor Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín

RESUMEN

Se realizó un estudio de serie de casos entre julio de 2005 y mayo de 2007 en la Clínica Estomatológica Universitaria Manuel Angulo Farrán de Holguín. Se estudiaron 104 pacientes bruxópatas mayores de 18 años de edad, de uno u otro sexo que cumplieron con los criterios de selección. El interrogatorio y el examen clínico permitieron identificar las alteraciones de la oclusión estática y dinámica. Se empleó el test de Spielberger para evaluar el nivel de ansiedad. El procesamiento estadístico mostró que el porcentaje de bruxópatas con resalte y sobrepase aumentado fue bajo (22,1% y 28,8%, respectivamente). La

relación canina y molar más frecuente fue la neutroclusión. La muestra exhibió un número elevado de bruxópatas con versiones, gresiones y desviación de la línea media. La presencia de interferencias oclusales fue alta, con el 94,2% en general. Los contactos prematuros en relación céntrica se detectaron en el 65,4% seguido de la lateralidad derecha en el lado de trabajo con un 60,6%. El nivel de ansiedad rasgo y estado alto predominó con el 54,8% y 52,9% respectivamente. Es necesario incrementar la divulgación de los factores etiológicos del bruxismo para su diagnóstico temprano, y la reducción de daños mayores en el aparato estomatognático.

Palabras clave: bruxismo, etiología, oclusión

ABSTRACT

A series of cases study from July 2005 to May 2007 at Manuel Angulo Farrán Dental Clinic in Holguín was performed. One hundred four bruxism patients older than 18 years of both sexes were studied taking into consideration the inclusion criteria. The interviews and clinical examinations allowed to identify some problems related with static and dynamic occlusion. Spielberg's test was applied to determine the level of anxiety. The high overjet and overbite were low (22.1% and 28.8% respectively). The canine and molar neutral occlusion was the most prevalent relation found. Dental bad position was high. The occlusal interferences were present in 94.2%; the contacts in centric relation in 65.4 % and in the right working side in 60.6% of patients. The high level of anxiety and high state prevailed in 54.8% and 52.9% of them respectively. The authors considered the need of increasing the population's knowledge on etiological factors of bruxism for an early diagnosis of this disease.

Key words: bruxism, etiology, occlusion

Correspondencia

Dra. Mildred Gutiérrez Segura. Correo electrónico mildred@cristal.hlg.sld.cu