

## Resumen

Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja. Holguín

## Diagnóstico miasmático de pacientes ingresados con asma bronquial

### Miasma Diagnosis in Patients Admitted with Bronchial Asthma

*Yuleibis Durán Ruiz*<sup>1</sup>, *Matilde S. Fagés Ramirez*<sup>2</sup>, *Esperanza Guilling Martinez*<sup>3</sup>,  
*María del Carmen García Niebla*<sup>4</sup>, *René Núñez Inza*<sup>5</sup>

- 1 Especialista de Primer Grado en Pediatría. Hospital Universitario Mártires de Mayarí. Holguín
- 2 Máster en Medicina Natural y Tradicional. Especialista de Segundo Grado en Alergología. Asistente. Hospital Pediátrico Universitario Octavio de la Concepción de la Pedraja. Holguín
- 3 Máster en Medicina Natural y Tradicional. Especialista de Segundo Grado en Laboratorio. Profesor Auxiliar. Hospital Pediátrico Universitario Octavio de la Concepción de la Pedraja. Holguín
- 4 Especialista de Primer Grado de Inmunología. Asistente. Hospital Pediátrico Universitario. Octavio de la Concepción de la Pedraja. Holguín
- 5 Máster en Atención Integral al Niño. Especialista de Primer Grado en Pediatría. Pediatra Oncólogo. Asistente. Hospital Pediátrico Universitario Octavio de la Concepción de la Pedraja. Holguín

## RESUMEN

Con el objetivo de profundizar en la caracterización miasmática y su relación con la severidad del asma, se realizó un estudio descriptivo transversal en 136 pacientes con esta enfermedad, edad comprendida entre los 5 y 15 años, de ambos sexos y

sin otras enfermedades asociadas que ingresaron en el Servicio de Respiratorio en 2006. Se revisaron las historias clínicas, se determinó la clasificación del asma bronquial y se les confeccionó la historia clínica homeopática para realizar el diagnóstico miasmático. Predominaron los asmáticos leves persistentes (36,03%). El miasma Sycosis fue el más frecuente (49,27%) en los asmáticos intermitentes, leves persistentes y moderados persistentes. El syphilínico predominó en los severos persistentes (47,75%). Se concluyó que existía evidencia de asociación entre los miasmas y la severidad del asma ( $\chi^2=14,66$ ), así como que el diagnóstico miasmático es una herramienta de gran valor en la prescripción del remedio homeopático específico.

Palabras clave: miasmas, homeopatía, asma bronquial

## ABSTRACT

With the objective of deepening in the miasma characterization and its relation with the severity of the asthma, a cross-sectional descriptive study was carried out in 136 asthmatic patients who aged between 5 and 15 years old, of both sexes and without other associated diseases, who were admitted to the Respiratory Service in 2006. A homeopathic clinical record was prepared in order to make the miasma diagnosis. The persistent mild asthmatic patients (36.03%) predominated. Sycosis miasma was the most frequent (49.27%) in the mild, persistent mild and persistent moderate asthmatic patients. Syphinic miasma predominated in severe persistent (47.75%). The authors concluded that there was an association evidence between miasmas and the severity of asthma ( $\chi^2=14.66$ ) and that miasma diagnosis is a greatly valuable tool for prescribing the specific homeopathic remedy.

Key words: miasma, homeopathy, bronchial asthma

## Correspondencia

Dra. Matilde Fagés Ramírez. Correo electrónico: [mfages@hpuh.hlg.sld.cu](mailto:mfages@hpuh.hlg.sld.cu)