

Resumen

Hospital General Universitario Vladimir I. Lenin. Holguín

Prescripción racional de antiinflamatorios no esteroideos en ancianos

Nonsteroid Anti-Inflammatory Drugs Rational Prescription in Elderly

*Armando Carlos Roca Socarrás*¹, *Luis Manuel Calero González*², *Dania Oropeza Pupo*³, *Kleydis Blanco Torres*⁴, *Caridad Carbó Salazar*⁵

1. Máster en Longevidad Satisfactoria. Especialista de Segundo Grado en Gerontología y Geriatria. Asistente. Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin. Holguín
2. Máster en Longevidad Satisfactoria. Especialista de Segundo Grado en Farmacología. Profesor Auxiliar. Facultad Ciencias Médicas. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín
3. Máster en Longevidad Satisfactoria. Especialista de Segundo Grado en Farmacología. Profesor Auxiliar. Facultad Ciencias Médicas. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín
4. Máster en Longevidad Satisfactoria. Licenciada en Enfermería. Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin. Holguín
5. Máster en Longevidad Satisfactoria. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructora. Dirección Provincial de Salud. Holguín

RESUMEN

Se trata el consumo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos por la población anciana en la atención primaria de salud. Se realizó un estudio de

prescripción indicación con el objetivo de identificar el uso inadecuado de estos fármacos en una muestra de 200 pacientes adultos mayores. El motivo de consulta evaluado fue el dolor articular. Entre los diagnósticos más frecuentes encontrados están la artrosis y la artritis. Un número elevado de ancianos presentan enfermedades crónicas no transmisibles en las que no es aconsejable prescribir antiinflamatorios. A pesar de esto existe una indicación mayor de fármacos con un grado potencial de bajo uso.

Palabras clave: ancianos, antiinflamatorios, dolor, atención primaria

ABSTRACT

The consumption of nonsteroid anti-inflammatory drugs in elderly patients at Primary Care was treated in this paper. A study with the objective of identifying the inadequate use of these drugs in a sample of 200 elderly patients was performed. The articular pain was the main cause of assistance. The artrosis and the arthritis are among the more frequent diagnoses. A high number of patients had noncommunicable chronic diseases, that do not need prescription. In spite of this there was a high prevalence of drug prescription indication of low potential grade of use.

Key words: elderly, anti-inflammatory drugs, pain, Primary Care

Correspondencia

Dr. Armando Carlos Roca Socarrás

Correo electrónico: aroca@cristal.hlg.sld.cu