

## Resumen

Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin

## Morbilidad y mortalidad por enfermedad cerebrovascular isquémica

### Morbidity and Mortality due to Ischemic Cerebrovascular Disease

*Damaris Rodríguez Padrón*<sup>1</sup>, *Carlos Octavio Galano González*<sup>2</sup>, *Araceli Padrón Sánchez*<sup>3</sup>, *Julio Rodríguez Padrón*<sup>4</sup>, *Annarelis Pérez Pupo*<sup>5</sup>

- 1 Máster en Urgencias Médicas en Atención Primaria. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Asistente. Dirección Provincial del Sistema Integrado de Urgencias Médicas. Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin. Holguín.
- 2 Máster en Urgencias Médicas en Atención Primaria. Especialista de Primer Grado en Medicina Intensiva y Emergencia. Asistente. Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin. Holguín.
- 3 Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Ginecología y Obstetricia. Asistente. Hospital Docente Universitario Vladimir Ilich Lenin. Holguín.
- 4 Residente de Medicina General Integral. Policlínica Mario Gutiérrez Ardaya.
- 5 Licenciada en Gestión de la Información en Salud. Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin. Holguín.

## RESUMEN

Las enfermedades cerebrovasculares constituyen la tercera causa de muerte en Cuba y en la mayoría de los países desarrollados, sus consecuencias causan postración e incapacidad. Se realizó un estudio descriptivo transversal en pacientes admitidos en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Docente Universitario

Vladimir Ilich Lenin en el periodo de enero a diciembre de 2010, con los objetivos de: identificar los factores de riesgo más frecuentes, evaluar los protocolos de actuación, definir grado de incapacidad al egreso, así como las causas principales de muerte. La enfermedad que tuvo mayor incidencia entre la séptima y octava décadas de la vida, y los factores de riesgo más frecuentes fueron la hipertensión arterial y el tabaquismo. Los protocolos de actuación fueron cumplidos adecuadamente en la mayoría de los casos. Solo 12,7% de los pacientes falleció y la causa de muerte más frecuente fue extraneurológica.

*Palabras clave:* enfermedad cerebrovascular isquémica, protocolo de actuación, mortalidad.

## **ABSTRACT**

Cerebrovascular diseases constitute the third fatal cause in Cuba and in most of the developed countries, its consequences cause prostration and disability. A descriptive, prospective and cross-sectional study in patients admitted at the Intermediate Care Unit of Vladimir Ilich Lenin Teaching Hospital, from January to December of 2010 was performed. The objective of this work was to identify the most frequent risk factors, assessing the behavior, defining the degree of disability, as well as, the most frequent fatal causes. The results showed that this disease had higher incidence between its seventh and eighth decades being high blood pressure and tobacco addiction the most frequent risk factors. The protocols of behavior were done adequately for most of patients. Only 12.7% of patients died and the extraneurological death was the most frequent one.

*Key words:* ischemic cerebrovascular disease, behavior; mortality.

## **Correspondencia**

MsC. Damaris Rodríguez Padrón. Correo electrónico: [aps@crystal.hlg.sld.cu](mailto:aps@crystal.hlg.sld.cu)